)1 v4

Malvasia de Manresa

Vass4R04s536-540



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp670

dente de la control de la cont

The financial de Manneson

FH

Malvasia de Manresa 4R4D536-540

> Malvasia de Manresa 4R4D536.540







dontoolootoolootoolootool





N° d'ordre:
Désignation: Malvasia flatalità de Mauresa }
Emplacement: 4R4S536-540.

THE HOURGEONNEMENT

Epanoui (187 - poven 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séleux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duvateux 189

cotonneur (97 - sans villosité pubescenta (779 - sans villosité

laineuse 279.

Blanc (17) - faure ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entiègement bronzé

ou cuivré 197 vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etaxées - en genttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 duveteuses 203 - cotomeuses 204 - sans millosité pubescente 280 sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou outurées 209 - entièrement bronzées ou outurées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas on la première feuille détachée est à lisées carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées mere notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux (17)duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente (RP)sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 227 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 287 sans villosité laineuse 285.

A limbo pran - en gouttière - involuté - révaluté - tourments.

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villocité pubascente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillen - partiellement.

25/37

N° d'ordre: Désignation: Halvaria finationies. Le Manresa.

Emplacement: 4 R 4 1.536.540

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entyèrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253,

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movemne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265).

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

JOIA 37

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année : 2001

Code introduction:

Observateur:

Code cépage:

Nom introduction: Malvaria de Manresa

Emplacement: h Rhs 536-540

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 3 grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq/3)- sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle D- point pétiolaire rouge 2

- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3)- révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente D- présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 1 - présente 9.

oiv 075 cloqûre face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre):

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 17 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1- présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente T- présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible D- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9. [sinus pétiolaire : ouverture = 1-2-3-4-5-6 / forme = U-accol. - (V) / dent = oui-non / dégarni = non parfois-oui]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré 1.

Formulaire de description 5/8

(maturité)

Année: 1998

Code cépage :

Code clone

Nom cépage: Malvaria de Manresa

Observateur: Lacombe

Emplacement: 4 R4 A536 5 40

Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue

22 (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3- moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule: très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5)- long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5)- plus de la moitié 7.

oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3)- plus de deux ailes 4

Baie

oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 3 - longue

(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.

oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5- large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9.

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3

oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2) elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1) rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2.)

oiv 227 pruine: nulle ou très faible 1 - faible 3)- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.

oiv 229 ombilic : peu apparent 1 - apparent (2)

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1 colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2.)

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies); faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.

oiv 236 saveur : aucune 12 goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5

oiv 236* saveur : aucune 1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle: très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long

(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5) difficile 7 - très difficile 9.

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3)

oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes(1)- présentes 2.

Formulaire de description 5/8 (maturité) Année: 2002 Observateur Code cépage : Code introduction: Nom introduction Malvaria de Manresa Emplacement Why 536_540 Grappe oiv 202 longueur : très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) Valeur absolue (en cm.) 26 oiv 203 largeur : très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 5 large (15-20 cm) - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 16 oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 3 - compacte 7 - très compacte 9 oiv 206 longueur pédoncule : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. 4,5 oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement P - moitié 5 - plus de la moitié 7 oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3 oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes 2)- plus de trois ailes 3 Baie oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) \$\mathbb{B}\$- longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) : 14 oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 3 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 14 oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3 oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 2 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6 oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9 oiv 229 ombilic : peu apparent 1 - apparent 2 oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée D- colorée 2 oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée & coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9 oiv 236 saveur : aucune (1) - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5 oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen & difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3 oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 52 longs 7 - très longs 9 6 oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9 oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes () - présentes 2

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année 2000 Code cépage

Code clone :

Observateur +>

Nom cépage Malvasia de Manresa

Emplacement: 4 R4 A536-540

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 🔊 oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 🕉

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris &

oiv 104 lenticelles absentes D - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence \emptyset - présence 9 oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds | absence \emptyset - présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 8 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9 - AA - coiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (-5mm) 1 - petit (8mm) 8 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (-17mm) 9 - 8 - Via 2 -

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse - très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - éleve / - très élevé 9.

Vassal

Noeuds aplatis I movens &- saillants 3

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année:

2001

Observateur: TD

Emplacement: 4 Rus 536-540

Code introduction: Code cépage : Nom introduction: Malvaria de Manresa

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3- aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée (3).

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 22- rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence / - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence Ø- présence 9

oiv 351 vigueur : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte I - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. Valeur absolue : YO

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3/2- moyen (11mm) 5

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 3

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3